

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 - Farmaceutica
Centro Regionale di Farmaco e Vaccinovigilanza

Prot. 23016

Del 06.05.2016

Oggetto: Comunicato AIFA su medicinali contenenti paracetamolo - casi di sovradosaggio intenzionale negli adolescenti

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Ai Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie
Ai Responsabili di Farmacovigilanza
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
Alla Federfarma
Ad Assofarm
e p.c. Ai Centri di riferimento di Farmacovigilanza

LORO SEDI

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con un recente comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale richiama l'attenzione sull'importanza di un uso corretto e consapevole del **paracetamolo**, con particolare riferimento ai casi di sovradosaggio intenzionale negli adolescenti.

L'assunzione di quantità superiori a quelle indicate nelle schede tecniche dei medicinali contenenti **paracetamolo** può infatti determinare effetti indesiderati anche gravi, in particolare a livello epatico.

L'AIFA ritiene quindi necessario mantenere alta l'attenzione sull'uso appropriato di questo principio attivo, soprattutto in una fascia di età vulnerabile.

Il richiamo si basa sull'analisi congiunta dei dati disponibili a livello nazionale, quelli inseriti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza e, in particolare, quelli del Centro Antiveleni di Pavia, che indicano un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale di **paracetamolo** negli adolescenti. Pur in assenza di un incremento dei casi nel tempo e di evidenze riconducibili a comportamenti imitativi o a presunte "sfide social", il fenomeno rappresenta un rischio clinico rilevante, soprattutto considerando la vulnerabilità in questa fascia di età.

Il sovradosaggio intenzionale può essere legato a gesti impulsivi o dimostrativi e a una errata percezione che il **paracetamolo** sia un medicinale privo di rischi. Per questo motivo è

importante che gli adolescenti siano consapevoli dei rischi legati all'uso improprio dei medicinali e che gli adulti di riferimento svolgano un ruolo attivo nel favorire una corretta informazione e un utilizzo responsabile.

Raccomandazioni per l'uso sicuro

Il *paracetamolo* è un medicinale indicato per il trattamento sintomatico del dolore e della febbre. Se assunto correttamente, è sicuro ed efficace; un uso improprio o l'assunzione di quantità superiori a quelle raccomandate può tuttavia determinare effetti indesiderati gravi, irreversibili nei casi più severi, in particolare a livello del fegato.


AIFA invita famiglie, pazienti, *caregiver* ed operatori sanitari a osservare alcune precauzioni:

- attenersi scrupolosamente alle dosi indicate nel foglio illustrativo o nella prescrizione medica;
- rispettare l'intervallo minimo tra le somministrazioni ed evitare l'uso contemporaneo di più medicinali contenenti *paracetamolo* o di altre sostanze potenzialmente epatotossiche;
- rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza o a un Centro Antiveneni in caso di sospetto sovradosaggio, anche in assenza di sintomi.

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo la massima collaborazione per la diffusione della presente.

Il Dirigente del Crfv

Dott.ssa Claudia Minore



~~Il Dirigente del Servizio~~

~~Dott. Pasquale Cananzi~~

